

СПИСОК МЕДИКАМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В СУДОВОЙ АПТЕЧКЕ

N	Наименование	вид упаковки	Количество		
			A	B	C
1.	Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) , 500 мг, 100 шт.	флакон	6	3	2
<p>Применение: (1) Обезболивающее средство при таких заболеваниях, как грипп, простуда и синусит. (2) Обезболивающее средство при головной боли, невралгии, мышечных болях и температуре. Дозировка для взрослых: При головной боли 1 - 2 таблетки 500 мг. По необходимости принимать каждые 6 часов. При сильных болях, не устраняемых ацетилсалициловой кислотой, назначается прием 2 таблеток вместе с одной таблеткой кодеина 30 мг. Внимание: В случае повышенной чувствительности к данному медикаменту, можно воспользоваться парацетамолом, как альтернативным лечением против несильных болей. При наличии расстройств желудочно-кишечного тракта, принимать препарат с молоком или во время еды.</p>					
2.	Спирт для наружного применения флакон (70 % этилоалкоголь), 500 мл		6	2	1
<p>Применение: Для дезинфекции кожи перед инъекциями. Для дезинфекции рук, тщательно протереть руки в течении 3 минут.</p>					
3.	Алюминий ацетат , ушные капли, 13 % раствор в 20 мл флаконе с пипеткой	Флакон	6	2	2
<p>Применение: Для лечение фурункулов и нарывов в ухе. Дозировка для взрослых: Капать 3-5 капель каждые 2-3 часа.</p>					
4.	Алюминий ацетат порошок, 2 г пакетик, для приготовления эквивалентного раствора алюминия ацетата (Бурова), 12 шт	Коробка	2	-	-
<p>Применение: Только для наружного употребления! Это эффективное средство для лечения воспаленных участков кожи при укусах насекомых, ядовитых плющей, и некоторых грибковых инфекциях, таких как „атлетические ступни" (острый дерматофитоз). Дозировка для взрослых: Размешать 1 или 2 пакета в 500 мл воды. Внимание: Не допускать попадания в глаза. Не принимать во внутрь.</p>					
5.	Алюминий гидроксид гель, с магнием гидроксидом или магнием трисиликатом, оральная суспензия, 360 мл	флакон	6	-	-
<p>Применение: Для лечения повышенной кислотности в желудке.</p>					
6.	Алюминий гидроксид , с магнием гидроксидом или магнием трисиликатом 1 г таблетированное средство. 100 шт	флакон	10	3	3
<p>Применение: Такое же как и у оральной суспензии, имеет однако менее эффективное действие. Дозировка для взрослых: 1 или 2 таблетки, тщательно разжевать и проглотить 2-4 часа после еды. При необходимости также перед сном.</p>					
7.	Свечи Аминофилина ректальные, 500 мг, 12 шт. (хранить в холодильнике)	коробка	2	1	-
<p>Применение: для облегчения приступов бронхиальной астмы. Применять только по назначению медицинской радио помощи. Дозировка для взрослых: ввести одну 500 мг свечу в ректальный проход. Дозу можно повторить через 8-12 часов.</p>					

8.	Аминотриптилин таблетки, 25 мг, 100 шт	флакон	1	1	-
<p>Применение: предназначается для лечения депрессий и беспокойных состояний. Применять только по назначению медицинской радио помощи. Дозировка для взрослых: Принимать 50 мг во внутрь в первый день перед едой, в последующие дни по 50 мг утром и вечером. Внимание: Препарат противопоказан больным глаукомой и хроническими заболеваниями печени. Запрещен прием алкоголя во время приема препарата!</p>					
9.	Ампициллин , капсулы, 250 мг, 100 шт	флакон	3	1	-
<p>Применение: Для лечения инфекционных заболеваний дыхательных путей, инфекций мочевыводящих путей, желудочно-кишечных инфекций, а также при ангине и инфекционных заболеваниях гортани. Дозировка для взрослых: Обычная доза 1-2 капсулы 2 раза в день. Курс лечения не больше 14 x 250 мг капсул. Ежедневный прием ампицилина должен сопровождаться одновременным приемом 2-4 500 мг таблеток Пробенецида. Внимание: Не принимать при аллергических реакциях на пенициллин!. Альтернативное лечение: N 31 или 76 или 81.</p>					
10.	Свечи против геморроя , 12 шт (желательно хранить в холодильнике)	коробка	6	1	-
<p>Применение: Для лечения геморроя. Дозировка для взрослых: вводить по одной свече как можно глубже в ректальный проход утром, перед сном и после каждого испражнения.</p>					
11.	Аскорбиновая кислота таблетки (витамин С), 50 мг, 100 шт.	флакон	3	1	-
<p>Применение: Состояния при повышенной температуре и инфекциях, при которых необходим прием данного витамина.</p>					
12.	Атропин сульфат инъекционный, 0,5 мг/мл, 1мл ампулы, 10 шт.	коробка	6	1	-
<p>Применение: Антидот при лечении отравлений. Воспользуйтесь медицинской радио помощью</p>					
13.	Бензатин бензолпенициллин инъекционный, 2,4 миллиона ЕД на 5-мл	инъекц. упаковка	20	-	-
<p>Применение: Как антибиотик, особенно при лечении сифилиса. Дозировка для взрослых: Обычная терапевтическая доза - 2,4 миллиона единиц, которая вводится одновременно внутримышечно. Внимание: Не принимать при аллергических реакциях на пенициллин!</p>					
14.	Мазь бензойной и салициловой кислоты , 30 г тюбик	тюбик	2	1	-
<p>Применение: Данная мазь применяется для лечения грибковых инфекций кожи. Дозировка для взрослых: Наносить мазь один или два раза в день на пораженную поверхность.</p>					
15.	Лосьон каламина , чистый, 120 мл	флакон	8	1	1
<p>Применение: Против чесотки и раздражения кожи. Хорошо взболтать перед употребления. Внимание: Только для наружного применения! Не наносить на открытые или мокнущие раны.</p>					
16.	Кальций глюконат , растворимые таблетки, 1 г, 30 шт.	коробка	1	-	-
<p>Применение: При отравлениях оксалициловой кислотой. Дозировка для взрослых: Растворить 5 таблеток в 250 мл воды, сразу же выпить.</p>					

17.	Раствор цетримида 40 % , 500 мл (дезинфицирующее ср-во)	флакон	3	1	1
-----	---	--------	---	---	---

Данное средство является концентратом; если требуется приготовить 1% раствор данное средство должно быть разбавлено. Применение: Дезинфицирующее средство, только для наружного употребления. Для дезинфекции кожи.

18.	Активированный уголь , порошок (общий антидот), 120 г	флакон	1	1	1
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Как начальное лечение почти всех отравлений. Дозировка для взрослых: 10 г (2 столовые ложки). Перед приемом размешать порошок в воде. Повторить прием, если пациента рвет.

19.	Таблетированное средство хлороквина фосфата , 250 мг, 100 шт. Для профилактики и лечения малярии	флакон	1	1	1
-----	---	--------	---	---	---

Дозировка для взрослых: Подробно см. отдел Малярия, стр. 135 и Последнюю малярийну(о карту мира.

20.	Хлорофенамин малеат таблетки, 4 мг, 20 шт.	флакон	3	1	-
-----	---	--------	---	---	---

Применение: Для лечения аллергических реакций. Дозировка для взрослых: 1 таблетку, 1-3 раза в день. Внимание: могут возникнуть такие побочные явления, как усталость. Не употреблять алкоголь во время приема медикамента.

21.	Хлорофенамин малеат инъекция , 10 мг, 1 мл ампулы, 10 шт	коробка	2	1	-
-----	---	---------	---	---	---

Применение: Для лечения аллергических реакций. Вводить подкожно или внутримышечно.

22.	Хлорпромазин гидрохлорид таблетки 25 мг, 20 шт.	флакон	4	2	-
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Для лечения беспокойных состояний, состояний напряжения, а также против тошноты. Дозировка для взрослых: 25 мг против рвоты, принимать 1 таблетку 3 раза в день.

23.	Хлорпромазин гидрохлорид инъекция , 25 мг в 1 ампуле, 10 шт.	коробка	2	1	-
-----	---	---------	---	---	---

Применение: Для внутримышечных инъекций. Дозировка для взрослых: 50 мг (см. стр. 165), доза может быть повторена через 6 часов.

24.	Гвоздичное масло , 20 мл	флакон	2	1	1
-----	---------------------------------	--------	---	---	---

Применение: Для облегчения зубной боли, при наличии дырок в зубах.

25.	Таблетки кодеина сульфата , 30 мг, 100 шт.	флакон	2	1	1
-----	---	--------	---	---	---

Применение: Для облегчения кашля (1), при поносе (2). Дозировка для взрослых: При сильном кашле принимать половинку 30 мг таблетки каждые два часа. При поносе, принимать по одной 30 мг таблетке каждые 4 часа. Внимание: Препарат является контролируемым средством.

26.	Таблетки циклизина-гидрохлорида , 50 мг, 100 шт.	флакон	4	1	1
-----	---	--------	---	---	---

Применение: Для устранения тошноты, рвоты. Против морской болезни. Дозировка для взрослых: Принять одну таблетку за 30 минут до начала путешествия или шторма. Продолжать принимать по 1 таблетке 3 раза в день перед едой.

27.	Инъекции декстрана 6% и содиума хлорида 0,9% , 500 мл, с набором для инфузии	флакон	6	-	-
-----	---	--------	---	---	---

Применение: Для увеличения объема плазмы и поддержания артериального давления. Примечание: применять только по указанию медицинской радио помощи.

28.	Диазепам , инъекции, 5 мг/мл, 2 мл ампулы	инъекция	20	-	-
-----	--	----------	----	---	---

Применение: для устранения возбуждения. Дозировка для взрослых: Обычная доза 2 - 10 мг (глубоко внутримышечно). Внимание: Препарат может применяться только по врачебному указанию. Препарат является контролируемым средством.

29.	Диазепам таблетки , 5 мг, 100 шт.	флакон	2	1	„
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Для устранения общего беспокойства и возбуждения. Дозировка для взрослых: Дозировка может варьировать от 2 до 10 мг, 2-4 раза в день, в зависимости от состояния больного.

30.	Димеркапрол инъекции , 100 мг в 2 мл ампулах, 10 шт.	коробка	6	2	1
-----	---	---------	---	---	---

Применение: Медикамент применяется как антидот при отравлениях арсеном, золотом и Меркурием. Всегда пользуйтесь медицинской радио помощью.

31.	Доксициклин гидрохлорид таблетки, 100 мг, 100 шт.	флакон	2	-	-
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Для лечения инфекций мочевыводящих путей. Дозировка для взрослых: Обычная доза - 200 мг в первый день лечения, по 100 мг каждые 12 часов, затем продолжать прием 100 мг ежедневно. В случае сильной инфекции, по 100 мг каждые 12 часов.

32.	Эфедрин сульфат таблетки , 25 мг, 100 шт.	флакон	1	-	-
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Для облегчения и для предотвращения приступов астмы. Воспользуйтесь медицинской радио помощью.

33.	Эпинефрин гидрохлорид инъекции , 1 :1000, 1 мл ампулы, 10 шт	коробка	2	1	1
-----	---	---------	---	---	---

Применение: При сильных приступах астмы и при тяжелых аллергических реакциях на пенициллин и другие медикаменты. Дозировка для взрослых: Подкожно или внутримышечно, 0,3 мл 1 : 1000 раствора, каждые 2 часа.

34.	Эргометрин малеат инъекции , 0,2 мг в 1 мл ампуле, 10 шт	коробка	1	-	-
-----	---	---------	---	---	---

Применение: Разрешено введение только одной ампулы и только после получения медицинской радио помощи.

35.	Эритромицин (стеарат или этилсуцинат) таблетки, 250 мг, 100 шт	флакон	3	1	-
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Для лечения различных инфекций верхних и нижних дыхательных путей. Дозировка для взрослых: По одной 250 мг таблетке 4 раза в день. Дозу можно увеличить до двух 250 мг таблеток 4 раза в день. Прием продолжать в течении 48 часов или пока не исчезнут симптомы.

36.	Анестезирующие капли для глаз, 0,5 % раствор тетракаина гидрохлорида в капающих флаконах, 10 мл	флакон	2	1	-
-----	---	--------	---	---	---

Применение: Для местной анестезии глаза, перед удалением инородного тела. Закапать 2 капли под глазное веко.

37.	Антиинфекционные капли для глаз, 1% раствор хлорамфеникола , в капающих флаконах, 10 мл	флакон	3	2	1
-----	---	--------	---	---	---

Применение: Для лечения инфекционных заболеваний глаз. Капать по 1-2 капле в каждый глаз 3 - 4 раза в день.

38.	Глазная мазь, 1% тетрациклин гидрохлорид, 4 г тюбик	тюбик	6	3	1
-----	---	-------	---	---	---

Применение: При внешних инфекциях глаз, воспалениях век. Если не наблюдается улучшение в течении 24 часов, необходимо воспользоваться медицинской радио помощью. Дозировка для взрослых: Наносить мазь на внутреннее и нижнее веко каждые 3-4 часа.

39.	Раствор для промывания глаз, изотонический , стерильный, в пластиковой бутылке, 120 мл	бутылка	6	1	1
-----	--	---------	---	---	---

Применение: При раздражении и жжении в глазах, а также для вымывания инородных тел. Перед применением необходимо разогреть бутылку до температуры тела.

40.	Флуоресцентная офтальмологическая полоска содиума	упаковка	1	-	-
-----	--	----------	---	---	---

стерильная (1%, на бумажном аппликаторе), 200 шт Применение: Данные полоски являются офтальмологическим диагностическим средством.

41.	Фуросемид таблетки, 40 мг, 100 шт	флакон	1	-	-
-----	--	--------	---	---	---

Применение: фуросемид является быстродействующим диуретиком, который вызывает выделение мочи воздействием на почки. Дозировка для взрослых: Обычная доза 20 - 80 мг утром, в течении 2 - 4 последующих дней каждой недели. Внимание: Воспользуйтесь медицинской радио помощью.

42.	Глицерил тринитрат таблетки, 0,5 мг, 20 шт	флакон	2	1	1
-----	---	--------	---	---	---

флакон держать плотно закрытым.. Хранить при температуре 0-25 С. Применение: При остром приступе ангины пекторис.

43.	Гидрокортизон натрия суцнат,	флаконт	5		
100 мг флакон, для внутривенных или внутримышечных инъекций Применение: Применять только по указаний медицинской радио помощи при (1) сильных шоках, (2) острых аллергических реакциях.					
44.	Гидрокортизон мазь 1%,	тюбик	6	2	2
30 г тюбик с ректальным аппликатором Применение: Для лечения некоторых дисфункций кожи. Дозировка для взрослых: Наносить тонкий слой на пораженные поверхности кожи 2 - 4 раза в день. Внимание: Не допускать попадания в глаза.					
45.	Мазь ихтиола и глицерина (ихтаммол 10%, глицерин, мягкий парафин, масло 90%) в 100 г в банке	банка	3	2	1
Применение: Для лечения нарывов, инфекций типа „Рыбачкие руки“, нарывов от соленой воды. Дозировка для взрослых: Наносить один раз в день на пораженные поверхности. Рыбачкие суда с экипажем более 30 человек должны иметь большее количество медикамента.					
46.	Распылитель от насекомых (раствор диетилалотуамида) 50 мл	флаконт	12	6	2
Применение: Для наружного употребления только! Распылять против комаров, мух и других кусающихся насекомых. Можно распылять на одежду или кожу, обеспечивает защиту на 8 часов. Внимание: Не допускать попадания в глаза, нос или рот.					
47.	Йод, 2,5 % раствор, в 100 мл флаконе со стеклянной крышкой	флаконт	4	2	1
На флаконах должно быть указано: „Только для наружного употребления!“ Применение: Для дезинфекции кожи вокруг ран и для лечения небольших порезов.					
48.	Лидокаин гидрохлорид 1%, 2 мл ампулы	инъекции	12	-	-
Применение: Как местная анестезия при небольших хирургических процедурах. Дозировка для взрослых: Несколько ампул для местной анестезии. Препарат должен медленно вводиться под кожу.					
49.	Линдан крем, 1%, 60 г тюбик	тюбик	12	2	-
Применение: Против чесоточных вшей. Дозировка для взрослых: После ванны или душа, нанести тонкий слой на пораженную поверхность кожи и волос (не наносить на лицо).					
50.	Суспенция магнeзия гидрохлорида 550 мг\ 10 мл, 500 мл	флаконт	8	2	2
Применение: Слабительное средство. Необходимо хорошо взболтать перед употреблением. Дозировка для взрослых: При запоре, принять 1\2 - 1 столовую ложку перед сном.					
51.	Метринидазол таблетки, 200 мг, 100 шт.	флаконт	5	2	-

Дозировка для взрослых: для лечения женских болезней, принимать по 1 таблетке каждые 8 часов в течении 2 недель. Для назначения лечения при амебной дизентерии, обратитесь за медицинской радио помощью.

52. **Миконазол нитрат, 2%, вагинальная мазь с аппликатором, в 80 г флаконе.** флакон 5 2 -

Применение: Для лечения наружного вагинального зуда.

53. **Миконазол нитрат, 100 мг, свечи с аппликатором** свечи 20 10 -

Применение: Для лечения генитального зуда. Вводить по одной свече глубоко во влагалище в течении 14 ночей.

54. **Минеральное масло (жидкий петролатум), 500 мл** флакон 1 1 -

Применение: Минеральное масло применяется для защиты кожи. Дозировка для взрослых: Наносить достаточное количество на кожу.

55. **Морфин сульфат инъекции, 10 мг/мл, 1 мл ампулы, 10 шт.** коробка 2 1 -

Применение: Для обезболивания при сильных болях, не устраняемых другими анальгетиками. Дозировка для взрослых: Ввести 10 - 15 мг внутримышечно. Внимание: Препарат является контролируемым медикаментом.

56. **Налоксон гидрохлорид инъекции, 0,4 мг/мл, 1 мл ампулы** ампулы 6 - -

Применение: Для реанимации при дыхательной недостаточности. Дозировка для взрослых: Вводить 0,4 мг подкожно или внутримышечно каждые 2 или 3 минуты до достижения благоприятного исхода.

57. **Неомицин+Бацитрацин мазь (5 мг неомицин +500 мг бацитрацинового цинка на 1 г), 30 г тюбик** тюбик 20 10 5

Применение: Для лечения и предотвращения инфекций при ожогах второй и третьей степени. Дозировка для взрослых: Наносить на очищенную поверхность ожога один или два раза в неделю, толщина слоя 1 - 2 мм. Хранить при температуре 2 - 20 C.

58. **Оральная регидрационная соль** пакетики 50 20 5

(содиум хлорид 3,5 г, содиум бикарбонат 2,5 г (или трисодиум цитрат 2,9 г), калий хлорид 1,5 г, глюкоза 20 г) в водонепроницаемых пакетиках

Содержимое пакета растворить в 1 литре кипяченной охлажденной воды. Применение: Для лечения поноса. Дозировка для взрослых: Пациенту необходимо быстро выпить весь приготовленный раствор, например по 1 стакану каждые 5-10 минут.

59. **Кислород, размер Е баллон** баллон 2 1

Баллон всегда должен быть наполнен кислородом. Применение: При кислородной недостаточности крови. Дозировка для взрослых: 6 - 8 литров в минуту через маску.

60. **Парацетомол, 500 мг таблетки** таблетки 300 150 100

Применение: Для обезболивания, для понижения температуры. Дозировка для взрослых: по 2 таблетки каждые 6 часов.

61.	Петролатум , белый, 60 г тубик	тубик	6	2	2
-----	---------------------------------------	-------	---	---	---

Применение: Как нейтральная защитная повязка. Наносится на небольшие ожоги, порезы или на сухую кожу.

2.	Фенобарбитал таблетки, 30 мг, 100 шт.	флакон	3	1	-
----	--	--------	---	---	---

Применение: При бессоннице, для достаточно длительного успокоения. Дозировка для взрослых: Для появления сонливости, принять 90 мг перед сном. Как седативное средство, по одной 30 мг таблетке, 1 - 4 раза в день. Внимание: Препарат является контролируемым медикаментом.

63.	Феноксиметилпенициллин потассиум таблетки 250 мг, 100 шт.	флакон	3	1	1
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Для чувствительных к данному медикаменту инфекций. Дозировка для взрослых: Начальная доза две 250 мг таблетки, затем по одной 250 мг таблетке каждые 6 часов. Внимание: Не принимать при наличии аллергии на пенициллин.

64.	Пилокарпин гидрохлорид глазные капли, 2%, 15 мл капающий флакон	флакон	2	1	-
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Для лечения глаукомы. Дозировка для взрослых: 2 капли через каждые 6 часов.

65.	Потассиум перманганат , 100 г	флакон	2	1	-
-----	--------------------------------------	--------	---	---	---

Применение: Растворив в воде (1 г кристаллов а 0, 5 - 1 литр воды); используется для дезинфекции кожи. Только для наружного употребления.

66.	Пробенецид таблетки , 500 мг, 100 шт.	флакон	2	1	-
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Дополнительное лечение при приеме пенициллина. Дозировка для взрослых: По одной 500 мг таблетке 4 раза в день, в течении всего периода приема пенициллина.

67.	Прокаин бензилпенициллин , стерильная суспензия, инъекция, 600 000 ЕД/мл, 1 мл флаконы, 10 шт Хранить в холодильнике.	коробка	2	1	-
-----	--	---------	---	---	---

Применение: Только по назначений медицинской радио помощи! Для лечения чувствительных к данному медикаменту инфекций. Вводить глубоко внутримышечно.

68.	Прокванил таблетки , 100 мг, 100 шт	Флакон	1	1	1
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Для предотвращения малярии. См. стр. 136-137 и последнюю малярийную карту мира для уточнения дозировки.

69.	Пирантел таблетки , 250 мг, 50 шт.	флакон	1	-	-
-----	---	--------	---	---	---

Применение: Для лечение глистовых инфекций. Дозировка для взрослых: Единовременная доза - 10 мг на килограмм веса пациента (то есть 2 таблетки для пациента весом 50 кг).

70.	Хинин сульфат таблетки , 300 мг, 100 шт.	флакон	2	-	-
-----	---	--------	---	---	---

Применение: Для лечения острых приступов малярии (см. Малярия, стр. 135). Дозировка для взрослых: При острых приступах малярии, принимать по 2 таблетки каждые 8 часов, пока пациента не осмотрит врач.

71.	Хинин дегидрохлорид инъекции, 300 мг/мл, 2 мл ампулы, 10 шт.	коробка	2	-	-
-----	---	---------	---	---	---

Применение: Для лечения острых приступов малярии (см. Малярия, стр. 135). Дозировка для взрослых: При острых приступах малярии, вводить по 600 мг внутримышечно.

72.	Сальбутамол ингаляционный аэрозоль	аэрозоль	2	1	—
-----	---	----------	---	---	---

Применение: При бронхиальной астме. Дозировка для взрослых: Обычно 0,1 - 0,5 мл (2 нажатия) раствора сальбутамола.

73	Содиум хлорид инъекции, 0,9%, 1000мл	флакон	6	2	-
----	---	--------	---	---	---

Необходимо воспользоваться медицинской радио помощью перед введением препарата.

74.	Содиум хлорид таблетки, 1 г, 1000 шт.	флакон	2	1	1
-----	--	--------	---	---	---

Применение: Для предотвращения теплового перенапряжения, теплового удара. Дозировка для взрослых: В зависимости от объема потовыделения. При обильном потовыделении принимать по 1 таблетке, запивая целым стаканом воды, каждые 4 часа во время работы.

75.	Спектиномицин гидрохлорид , инъекции, 2 г в 5 мл флаконе	флакон	20	-	-
-----	---	--------	----	---	---

Дозировка для взрослых: Для начального лечения острого неосложненного гонорейного уретрита, вводится единовременная доза 2 г (5 мл) внутримышечно.

76.	Сульфаметоксазол+Триметроприм (400 мг +80 мг), таблетки, 20 шт.	флакон	10	5	-
-----	--	--------	----	---	---

Применение: Для лечения инфекций мочевыводящих путей. Дозировка для взрослых: по 1-2 таблетке каждые 12 часов в течении 7 дней. Принимать, запивая, стаканом воды.

77.	Тальк (тальковая пудра) , 120 г	банка	6	3	3
-----	---	-------	---	---	---

Применение: Для припудривания кожи.

78.	Тетанус Иммун хуман глобулин , 250 Ед, пузырек или ампула	пузырек	5	-	-
-----	--	---------	---	---	---

Применение: Для обеспечения пассивного иммунитета пациента к столбняку. Дозировка для взрослых: Для пассивной иммунизации, вводить 250 единиц только внутримышечно. Хранить при температуре 2 - 8 С и не допускать замораживания медикамента. Примечание: Медикамент должен храниться только на судах, перевозящих лошадей, скот и шкуры.

79.	Тетанус токсоид адсорбированный , одна доза, ампула	ампула	10	-	-
-----	--	--------	----	---	---

Применение: Для активной иммунизации против столбняка. Дозировка для взрослых: Для начальной иммунизации взрослых необходимо введение 3 доз медикамента. Хранить при температуре 2 - 8 С и не допускать замораживания медикамента.

80.	Тетрациклин капли для уха, 1 % раствор тетрациклина в капающем флаконе, 10 мл	флакон	10	5	1
-----	--	--------	----	---	---

Применение: Для лечения инфекций уха (см стр. 192). Дозировка для взрослых: Закапывать 3 - 5 капель, 3-4 раза в день в течении 3-5 дней.

81	Тетрациклин гидрохлорид капсулы, 250 мг, 100 шт.	флакон	3	1	-
----	---	--------	---	---	---

Применение: Для лечения восприимчивых к медикаменту инфекций. Дозировка для взрослых: Обычно, по одной 250 мг капсуле каждые 6 часов.

82.	Вода стерильная , 5 мл ампулы, 10 шт.	коробка	3	2	-
-----	--	---------	---	---	---

Применение: Для разведения порошкового пенициллина.

83.	Цинковая оксидная паста , 30 г	тюбик	12	3	3
-----	---------------------------------------	-------	----	---	---

Применение: Нетоксичный, защитный, водостойчивый препарат. Дозировка для взрослых: Наносить по необходимости тонким слоем на кожную поверхность.



WHO

А

Активированный уголь, 3
Алюминий ацетат, 1
Алюминий гидроксид, 1
Аминотриптилин, 2
Ампициллин, 2
Аскорбиновая кислота, 2
Аспирин, 1
Атропин сульфат, 2
Ацетилсалициловая кислота, 1

Б

Бензатин бензолпенициллин, 2

В

Вода стерильная, 10

Г

Гвоздичное масло, 3
Гидрокортизон мазь 1%, 6
Гидрокортизон натрия суцинат, 6
Глазная мазь, 1% тетрациклин гидрохлорид, 5
Глицерил тринитрат таблетки, 5

Д

Диазепам, 4
Димеркапрол инъекции, 4
Доксициклин гидрохлорид, 4

И

Инъекции декстрана 6% и натрия хлорида 0,9%, 4

Й

Йод, 2,5 %, 6

К

Кальций глюконат, 2
Кислород, размер Е баллон, 7

Л

Лидокаин гидрохлорид 1%, 6
Линдан крем, 6
Лосьон каламина, 2

М

Мазь бензойной и салициловой кислоты, 2

Мазь ихтиола и глицерина, 6
Метринидазол таблетки, 6
Миконазол нитрат, 7
Минеральное масло (жидкий петролатум), 7
Морфин сульфат инъекции, 7

Н

Налоксон гидрохлорид инъекции, 7
Неомицин+Бацитрацин мазь, 7

О

Оральная регидрационная соль, 7

П

Парацетомол, 7
Петролатум, 7
Пилокарпин гидрохлорид, 8
Пирантел таблетки, 8
Потассиум перманганат, 8
Пробенецид таблетки, 8
Прокаин бензилпенициллин, 8
Прокванил таблетки, 8

Р

Распылитель от насекомых (раствор диэтилтолуамида), 6
Раствор для промывания глаз, изотонический, 5
Раствор цетримида 40 %, 3

С

Сальбутамол, 9
Свечи Аминофилина, 1
Свечи против геморроя, 2
Содиум хлорид, 9
Спектиномицин гидрохлорид, 9
Сульфаметоксазол+Триметроприм, 9
Суспензия магnezия гидрохлорида, 6

Т

Таблетированное средство хлороквина фосфата, 3
Таблетки кодеина сульфата, 4
Таблетки циклизина-гидрохлорида, 4
Тальк (тальковая пудра), 9
Тетанус Иммуно хуман глобулин, 9
Тетанус токсин адсорбированный, 9
Тетрациклин гидрохлорид, 10
Тетрациклин капли, 10

Ф

Фенобарбитал, 8
Феноксиметилпенициллин потассиум, 8
Флуоресцентная офтальмологическая полоска содиума, 5

Фуросемид таблетки, 5

Х

Хинин дегидрохлорид, 9

Хинин сульфат таблетки, 8

Хлорофенамин, 3

Хлорпромазин гидрохлорид, 3

Ц

Цинковая оксидная паста, 10

Э

Эпинефрин гидрохлорид инъекции, 4

Эргометрин малеат инъекции, 4

Эритромицин (стеарат или этилсукцинат), 5

Эфедрин сульфат таблетки, 4

И
Н
Д
Е
К
С